

Coffee Disease Survey in Tanzania

**D.L. KILAMBO¹, N. NG'HOMA¹, R. MAHAMED¹, J.M. TERI¹, G. ODUOR²,
N. PHIRI², A. FLORI³, F. PINARD³**

¹TACRI, Po Box 3004, Moshi, Tanzania

²CABI Arc. Po Box 633, Village Market, Nairobi, Kenya

³CIRAD-ICRAF, Po Box 30677, Gigiri, Nairobi, Kenya

SUMMARY

In Tanzania, the coffee plantations mainly suffer from Die Back due to physiological weakness. Leaf Minor and Leaf Rust are commonly observed, the latter causing significant leaf damage. In the Kilimanjaro area, Stem Borers are the pest causing most damage, with high plant destructive potential. The presence of CWD has been confirmed, it was exclusively found on Robusta coffee in the Kagera region. Other diseases on root and bark are of limited importance at the national level.

RÉSUMÉ

En Tanzanie, la zone caféicole est principalement victime de Die Back dû à la faiblesse des plantes. Mineuse des feuilles et rouille orangée sont très fréquentes, la dernière ayant un plus fort impact. Les foreurs et mineurs du tronc sont les plus dommageables dans la région Kilimanjaro. L'avancée de la trachéomycose exclusivement sur café Robusta est confirmée à partir de l'Ouganda, dans la région de Kagera. Les maladies de l'écorce et des racines sont peu présentes à l'échelle nationale.