

Le scolyte des fruits du caféier (*Hypothenemus hampei* Ferr.) au Togo: Etat actuel et perspectives

K. WEGBE

Centre de Recherche Agronomique zone Forestière (CRA-F), B.P. 90 Kpalimé, Togo.
E-mail: wegbepascal@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Le scolyte des fruits du caféier est un important ravageur de par le monde. La lutte chimique contre cet insecte est difficile et est souvent freinée par des problèmes de résistance et des résidus insecticides dans le grain consommé. Le problème du scolyte date de très longtemps au Togo mais les études sur le ravageur n'ont débuté qu'en 1987. A partir de cette année, divers travaux ont permis de mieux connaître ce déprédateur. Les taux d'attaque atteignent 19% sur les plateaux et les pertes de production y sont évaluées à plus de 90 Kg/ha. Ces mêmes travaux ont permis de préciser le seuil de dégât économique avec utilisation de l'endosulfan. Dans les plantations, deux principaux parasitoïdes ont été répertoriés (*Cephalonomia stephanoderis* Betrem et *Phymastichus coffea* La Salle). Des méthodes d'élevage permettent de produire ces insectes au laboratoire. L'étude de leur efficacité a été abordée et a montré qu'il existerait un effet synergique des deux parasitoïdes pour la réduction des populations du ravageur. De nouvelles études sont actuellement initiées pour déterminer dans les plantations l'influence des facteurs climatiques et agronomiques sur les variations d'abondance des parasitoïdes dans les différentes zones de production.

Mots clé: Caféier, *Hypothenemus hampei*, *Cephalonomia stephanoderis*, *Phymastichus coffea*, Togo.